FICHA TÉCNICA

normodent

clorhexidina 0,12%



PASTA NORMODENT CLORHEXIDINA 0.12%

DESCRIPCIÓN

Pasta dental con clorhexidina 0.12%.
Nº Reg AEMPS: 1201-DENT

CARACTERÍSTICAS

- Pasta consistente blanca.
- Olor y sabor a **menta**.
- Coadyuvante del **tratamiento periodontal.**
- **Combate la placa bacteriana**, destruyendo los microorganismos responsables de su formación, sin rayar el esmalte.
- **Contiene Flúor**, que ayuda a remineralizar el esmalte y a prevenir la placa bacteriana.
- Contenido en ion flúor – 2500ppm de ion flúor.

ACONDICIONAMIENTO

Estuche con tubo de pasta dental de 125ml.

PRECAUCIONES DE USO

- No ingerir.
- Indicado para niños **mayores de 12 años y adultos.**
- Conservar a una temperatura entre 0ºC y 30ºC.
- Una vez abierto, utilizar el producto durante los próximos **12 meses.**
- **Contraindicado en casos de hipersensibilidad a la clorhexidina** (estas reacciones son extremadamente raras)
- En algunos casos puede presentarse alteración del gusto y sensación urente en la lengua, que generalmente disminuyen con el uso continuado del producto. Tras el uso prolongado y al contacto con ciertas bebidas y alimentos tales como vino tinto y café y también con el tabaco puede presentarse coloración de los dientes y de los empastes. Esta coloración no es permanente y puede eliminarse con una profilaxis dental adecuada.

COLUTORIO NORMODENT CLORHEXIDINA 0.12%

DESCRIPCIÓN

Colutorio dental con clorhexidina 0.12%.
Nº Reg AEMPS: 1289-DENT

CARACTERÍSTICAS

- Líquido transparente rosado.
- Olor y sabor a **menta**.
- Coadyuvante del **tratamiento periodontal**.

ACONDICIONAMIENTO

Envase blanco de 500ml con vaso medidor retractilado.

PRECAUCIONES DE USO

- No ingerir.
- Indicado para niños **mayores de 12 años y adultos.**
- **Contraindicado en casos de hipersensibilidad a la clorhexidina** (estas reacciones son extremadamente raras)
- En algunos casos puede presentarse alteración del gusto y sensación urente en la lengua, que generalmente disminuyen con el uso continuado del producto. Tras el uso prolongado y al contacto con ciertas bebidas y alimentos tales como vino tinto y café y también con el tabaco puede presentarse coloración de los dientes y de los empastes. Esta coloración no es permanente y puede eliminarse con una profilaxis dental adecuada.
- **Proteger de la luz solar.**
- Conservar a una temperatura entre 0ºC y 30ºC.
- Una vez abierto, utilizar el producto durante los próximos **12 meses.**

PASTA NORMODENT CLORHEXIDINA 0.12%

MODO DE EMPLEO

Cepillar los dientes **2 ó 3 minutos** después de cada comida, al menos dos veces al día.

Para obtener la máxima eficacia se aconseja el **uso conjunto de la pasta de dientes con nuestro colutorio Normodent Clorhexidina 0.12%**

COMPOSICIÓN

Aqua, Hydrated Silica, Sorbitol, Cellulose Gum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Aroma, Cocamidopropyl Betaine, Titanium Dioxide, Sodium Fluoride, Sodium Monofluorophosphate, Tocopheryl Acetate, Sodium Methylparaben, Chlorhexidine Digluconate, Sodium Saccharin, Sodium Propylparaben, Sodium Benzoate, Limonene.

COLUTORIO NORMODENT CLORHEXIDINA 0.12%

MODO DE EMPLEO

Después del cepillado dental, realizar un enjuague bucal con 15 ml de Normodent Clorhexidina 0.12% durante **30 segundos.**

COMPOSICIÓN

Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Benzoate, Sodium Methylparaben, Aroma, Chlorhexidine Digluconate (0,12%), Potassium Acesulfame, Citric Acid, CI 14720.

NORMON OTC